Foie : méthodes d'imagerie : échographie-Doppler

- Examen de 1ère ligne, non-vulnérant et facilement disponible
 - Détection des tumeurs
 - Morphologie du foie : cirrhose
 - Signes d'hypertension portale
 - Perméabilité des vaisseaux
 - Direction et vitesse des flux

Foie : méthodes d'imagerie : échographie-Doppler

- Examen de 1ère ligne, non-vulnérant et facilement disponible
 - Détection des tumeurs
 - Morphologie du foie : cirrhose
 - Signes d'hypertension portale
 - Perméabilité des vaisseaux
 - Direction et vitesse des flux
- Limites
 - Méthode qui dépend de l'opérateur et du patient
 - Détection des lésions souvent moindre qu'en CT et IRM
 - Caractérisation tumorale limitée

Foie : méthodes d'imagerie : échographie-Doppler

- Examen de 1ère ligne, non-vulnérant et facilement disponible
 - Détection des tumeurs
 - Morphologie du foie : cirrhose
 - Signes d'hypertension portale
 - Perméabilité des vaisseaux
 - Direction et vitesse des flux
- Limites
 - Méthode qui dépend de l'opérateur et du patient
 - Détection des lésions souvent moindre qu'en CT et IRM
 - Caractérisation tumorale limitée
- Dépistage et suivi

Echographie en mode Couleur

Echographie avec injection de produit de contraste (Sonovue)

La taille des microbulles oscillent entre 1 et 10 micromètres

Hémangiome et échographie de contraste

Non C*

C* arterial.....portal.....delayed (5 min)

	Mode B	Couleur	Contraste
Lésion -Localiser -caractériser	X	X	X
Aspect du foie	X		
Voies biliaires	X		
Perméabilité VX foie	X	X	X
Anatomie vasculaire foie	X	X	

Tomodensitométrie : TDM

- Examen le plus répandu
- Scanners spiralés multicoupes :
amélioration de la vitesse
- Examen global du thorax et de l'abdomen
- Inconvénients
 - Irradiation
 - Agents de contraste iodés
 - Détection et caractérisation tumorales meilleures en IRM

Tomodensitométrie (TDM) et injection iodée

- 1. Phase à blanc
- 2. Phase vasculaire : 35 s
- 3. Phase portale : 70 s
- 4. Phase tardive: après 5 min

Figure 4b. CT liver perfusion images and graph that shows enhancement curves.

Pandharipande P V et al. Radiology 2005;234:661-673

Radiology

©2005 by Radiological Society of North America

IRM

- Meilleure résolution en contraste que TDM
- Souvent résolution spatiale moindre
- Examen de référence pour le foie
- TDM reste le meilleur choix pour les examens thoraco-abdominaux globaux
- Inconvénients
 - Durée d'examen
 - Coût
 - Disponibilité limitée

Hemangioma MRI

T2 no contrast

T1 no contrast

T1 + Contrast arterial

T1 + Contrast portal

Lesions focales bénignes : kyste biliaire

- Fréquent et habituellement asymptomatique
- Rarement compression des voies biliaires ou douleurs si hémorragie ou surinfection
- Echographie : anéchogène, parois fines, renforcement postérieur des échos
- TDM : densité liquidienne, pas de rehaussement
- IRM : hypointense en T1, hyperintense en T2, pas de rehaussement

Lésions hépatiques focales : kyste biliaire

Formations kystiques atypiques

- Kystes hémorragiques ou surinfectés
- Kystes parasitaires : échinococcose
- Tumeurs kystiques : métastases et cystadénomes

Kyste hydatique

Atypical cyst

- Cystic metastases and cystadenoma

Abcès

- Infection microbienne, amibienne ou fongique
- Contamination
 - Biliaire
 - Portale
 - Artérielle
 - Voisinage
 - Idiopathique
- Collection multiloculée, encapsulée avec troubles de perfusion de voisinage

Tumeurs hépatiques bénignes

- Fréquentes : 52% des sujets dans une série d'autopsies
 - Adénomes biliaires ou microhamartomes (complexes de von Meyenbourg, pas souvent observés en imagerie car petite taille)
 - Hémangiomes : 5 - 20%
 - Kystes hépatiques : 2 - 7%
 - Hyperplasie nodulaire focale : 1%
- Imagerie : caractérisation

Tumeurs hépatiques

- Tumeurs bénignes
 - Hémangiome
 - Hyperplasie nodulaire focale
 - Adénome
- Tumeurs malignes
 - Métastase
 - Hépatocarcinome
 - Cholangiocarcinome
 - Tumeurs vasculaires

hémangiome

Arterial phase

Portal phase

Delayed phase

HNF

hépatocarcinome

Arterial phase

Portal phase

Delayed phase

Metastases

Hémangiome

- Tumeur bénigne fréquente, formée de canaux vasculaires. Habituellement asymptomatique

Hémangiome

- US
 - Hyperéchogène, homogène, bien limitée
 - Mais formes atypiques et autres tumeurs peuvent avoir aspect semblable
- TDM et IRM
 - Rehaussement nodulaire périphérique et remplissage centripète
 - Fortement hypointense en T1 et hyperintense en T2

Hémangiome

- US
 - Hyperéchogène, homogène, bien limitée
 - Mais formes atypiques et autres tumeurs peuvent avoir aspect semblable
- TDM et IRM
 - Rehaussement nodulaire périphérique et remplissage centripète
 - Fortement hypointense en T1 et hyperintense en T2

Hemangioma MRI

T2 no contrast

T1 no contrast

T1 + Contrast arterial

T1 + Contrast portal

Hyperplasie nodulaire focale

- Tumeur bénigne relativement fréquente
- Hyperplasie du parenchyme secondaire à une malformation artérielle
- Pseudotumeur formée par des nodules séparés par des septa fibreux pouvant former une cicatrice stellaire centrale
- Plus fréquente chez la femme et habituellement asymptomatique

Hyperplasie nodulaire focale

- US : peu spécifique, vascularisation artérielle au Doppler et cicatrice centrale
- TDM et IRM
 - Rehaussement intense, homogène et transitoire à la phase artérielle
 - Rehaussement tardif de la cicatrice
 - Presque isointense en T1 et T2

HNF typique

- US
 - presque invisible en échographie
 - déplace les vaisseaux adjacents
 - artère nourricière centrale
 - aspect en roue à rayons
 - Index de résistance faible ($<0,51$)
- CT (multiphases, irradiation , contraste < IRM)
 - discrètement hypodense
 - hypervascularisée
 - isodense ou légèrement hyperdense tardivement
 - homogène, contours lobulés, pas de capsule
 - cicatrice centrale rehaussant tardivement

HNF et IRM

- **7 critères majeurs** (spécificité proche de 100% mais prévalence des critères allant de 22-70%)
 - semblable au parenchyme hépatique adjacent
iso ou discrètement hypoT1 (94-100%)
iso ou discrètement hyperT2 (94-100%)
 - homogène hormis la cicatrice centrale
 - cicatrice centrale hypoT1 et très hyperT2 (78-84%)
 - rehaussement intense en phase artérielle sans washout
 - pas de capsule
 - aspect lobulé
 - **pas de maladie hépatique associée ni d'antécédent de cancer**

En mode B, lésion hypoéchogène, hétérogène, bien limitée sans caractère diagnostique typique

En Doppler couleur, identification d'une vascularisation avec convergence centrale, suggestive d'une HNF

En IRM, sur la phase artérielle tardive, on visualise clairement la cicatrice centrale de la lésion richement vascularisée.

Mode B

=>

Doppler couleur

Utilisation de contraste hépato-spécifique

Tps : artérielportal.....2 h

Adénome

- Tumeur rare, formée d'hépatocytes normaux, stéatosique, ou atypique, => biologie moléculaire pour sous typer;
- Tumeur parfois oestrogéno-dépendante
- Asymptomatique ou douleurs abdominales si nécrose et hémorragie
- Traitement : chirurgie

Adénome : imagerie

- Contours lisses
- Signal variable et souvent hétérogène
- Vascularisation variable mais moindre que HNF
- Pas de critère absolu pour DD/ hépatocarcinome

Adénome

altérations des voies métaboliques et aspects morphologiques variables

- **HNF1- α inactivée (25-40%)** (hepatocyte nuclear factor)
 - Gène HNF contrôle le métabolisme lipidique,
 - diminution de la LFABP (liver fatty acid binding protein)
 - stéatose diffuse (>60%)
- **β -caténine muté (5-10%)**
 - risque de dégénérescence en HCC
 - atypie cellulaire, aspect pseudoglandulaire, pas de stéatose
 - accumulation nucléaire de la **β -caténine**
 - marquage diffus et homogène à la Glutamine Synthetase
- **Télangiectasique/inflammatoire (45-55%)**
 - majoration des marqueurs de l'inflammation (CRP, SAA)
 - β -caténine muté 10%
 - parfois stéatose intratumorale
 - dilatation sinusoidale, vaisseaux dystrophiques sans fibrose
 - associé à l'obésité, la stéatose hépatique (40%)
- **Inclassable (5-10%)**
 - pas d'altération génétique

Adénome HNF1- α inactivée (25-40%)

- présence de graisse diffuse avec une **chute de signal marquée et homogène en T1 OP** (sensibilité: 87-91%, spécificité: 89-100%)

Hépatocarcinome

- Cirrhose
- Forme nodulaire ou infiltrante
- Capsule
- Envahissement tumoral dans les branches portales et sus-hépatiques
- Imagerie
 - Détection difficile dans la cirrhose
 - Hypervascularisation artérielle
 - Aspect hétérogène si grande taille

CHC

Hépatocarcinome

Figure 1

DIAGNOSIS	AP	PVP	LP	Variations	Description
RN					All phases: Isovascular
DN				There are a spectrum of vascular changes as nodules transition from RN, DN to well-differentiated HCC	AP: Hypovascular PVP/LP: Isovascular
HCC				AP: No contrast enhancement PVP/LP: No wash out	AP: Hypervascular PVP/LP: Late and weak washout
Cholangiocarcinoma	or				AP: Hypervascular or rim enhancement PVP/LP: Punched out and/or rapid washout < 60 seconds
Hemangioma			or		AP: Peripheral nodular enhancement and centripetal progression of enhancement PVP/LP: Complete or partial fill in

Wojan Yu

Figure 1: Schematic shows the typical enhancement patterns of common benign and malignant lesions in the cirrhotic liver. *RN* = regenerative nodule, *DN* = dysplastic nodule, *AP* = arterial phase, *PVP* = portal venous phase, *LP* = late phase

Les radiologues et les cliniciens en charge de ce type de patients discutent des lésions hépatiques suspectes d'hépatocarcinome en utilisant un système de gradation de probabilité/sévérité, accepté et remis à jour par les communautés scientifiques internationales => c'est le score LIRADS.

CT/MRI LI-RADS® v2018 CORE

Untreated observation without pathologic proof in [patient at high risk for HCC](#)

Otherwise, use CT/MRI diagnostic table below

« **Liver Imaging Reporting and Data System (LI-RADS)** »

⇒ Lien internet :

<https://www.acr.org/Clinical-Resources/Reporting-and-Data-Systems/LI-RADS/CT-MRI-LI-RADS-v2018>

Cholangiocarcinome

- Cholangiocarcinome intrahépatique est rare
- Masse souvent hypovascularisée et fibreuse

Tumeurs malignes vasculaires

- Angiosarcome
- Hémangioendothéliome épithélioïde

Métastases

- Foie : site fréquent de métastases

Métastases d'un cancer colo-rectal

Métastases

- Résection peut améliorer la survie, en particulier dans les tumeurs colorectales

20807121875

Métastases

- Imagerie

- Métastases hypovascularisées : souvent aspect en cible
- Métastases hypervascularisées : rehaussement transitoire
 - Tumeurs neuroendocrines
 - Carcinomes rénaux
 - Sarcomes
 - Mélanomes

Métastases

- Foie : site fréquent de métastases
- Résection peut améliorer la survie, en particulier dans les tumeurs colorectales
- Imagerie
 - Métastases hypovascularisées : souvent aspect en cible
 - Métastases hypervascularisées : rehaussement transitoire
 - Tumeurs neuroendocrines
 - Carcinomes rénaux
 - Sarcomes
 - Mélanomes
- Bilan préopératoire :
 - Nombre
 - Localisation segmentaire
 - Rapports vasculaires
 - Volume hépatique

	Echo	CT	IRM
Lésion -Localiser -caractériser	X	X	X
Aspect du foie	X	X	X
Voies biliaires	X	X	X
Perméabilité VX foie	X	X	X
Anatomie vasculaire foie	X	X	X
Volumétrie		X	X