DES INTERUNIVERSITAIRE DE RADIOLOGIE

Cours de spécialité

Secteur de Neuroradiologie

Vasculopathies cérébrales

Dr Thierry Duprez

Professeur Clinique

Chef de Clinique

Université catholique de Louvain

Cliniques universitaires Saint-Luc

thierry.duprez@uclouvain.be

http://www.saintluc.be

Vendredi 12 février 2021

Athérosclérose

Athérome : modifications de contenu de la paroi -> **réduction de calibre**
sclérose : modifications de consistance -> **durcissement**

« plaques calciques » ou « athéromatose calcifiante » ou « plaques athéromateuses calcifiées »

Grands vaisseaux exo/endocrâniens: arthérosclérose

« *Plaque dure* » (calcique)

Petits vaisseaux : artériolosclérose endocrânienne (*SVD: Small Vessels Disease*)

North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial

European Carotid Surgical Trial

« *Plaque molle* » (cholestérolique)

Processus au long cours: incidence augmente avec l'âge (*'On a l'âge de ses artères'*)

Physiopathologie multifactorielle:

- **Accumulation de lipides**
- **Inflammation**
- **Oxydation des low density lipoprotéines (LDL)**
 - > expression de gènes inflammatoires
 - molécules d'adhésion
 - métalloprotéinases matricielles
 - néo-angiogenèse

© Anne G. OSBORN

Facteurs de risque vasculaires (FRCV)

- Age
- Obésité (*BMI*)
- Diabète type II
- hyperlipidémie
- HTA systémique au long cours
- Tabagisme

Rupture de plaque

- fragmentation → libération d'embols en distalité
- Hémorragie intraplaque → sténose critique → (dissection)

DD

Vasospasme

Dissection

Dysplasie fibro-musculaire (DFM)

Loi de Bernouilli

Athérosclérose

Athériolosclérose

SVD: *Small Vessel Disease*

SVD: Small Vessel Disease

Perforantes de la substance blanche

'Leucoraiose'

- Démyélinisation
- Perte axonale
- Fluide interstitiel (LCR)
- Gliose
- Spongiose
- EPV élargis

ASVD: Age-related Small Vessel Disease

'On a l'âge de son cerveau'

Démence 'sous-corticale'
SAE (Subcortical Arteriolosclerotic Encephalopathy)
Maladie de Binswanger

Dysplasie Fibro-Musculaire 'DFM'

Art. **rénales**
Art. **exocrâniennes**
Art. **endocrâniennes**
ACI > AV

FMD: Fibro-Muscular Dysplasia

1 ou **plusieurs** vaisseaux
Risque **anévrismal**

Dissection artérielle

Pathologie du **sujet jeune**

(AVC ischémique chez une jeune adulte → penser dissection)

Forme classique: déchirure – fausse lumière – ré-entrée - ‘flap’ occlusif

Forme compliquée: anévrisme disséquant (‘outpouching’)

‘Traumatique’ AVP – acc. sport – ‘iatrogène’ (ostéopathe)

‘Spontanée’ non traumatique mais avec ‘facteurs de risque’:

- *activité physique intense
- *hypertension systémique
- *migraine
- *vasculopathies: DFM, Marfan, connectivite (Ehlers-Danlos)

© Anne G. OSBORN

1. Elargissement du vaisseau
2. Réduction de la lumière fluente
3. Excentration de la lumière fluente
4. Croissant mural (fausse lumière)

Bon pronostic...

90% de retour à la normale de la lumière
1% de **récidive** endéans le premier mois
1%/an

...Complications

AVC ischémique aigu

Anévrisme disséquant

Claude Bernard Horner

Acouphènes pulsatiles

Céphalées – **douleurs locales**

Contrôles

Traitement

Contrôle tensionnel
AC 6 mois / AAP
(Stenting)

Pseudo-anévrisme disséquant

01.2021

06.2026

CTA >> MRA

« Bec de flûte »

Syndromes vasoconstrictifs

Vasospasme

Hémorragie Sous-Arachnoïdienne (HSA)

Migraine

(traumatisme)

(infection)

(drogues)

R.C.V.S. (*Call-Fleming syndrome*)

Reversible cerebral vasoconstriction syndrome

(Femmes d'âge moyen)

Angiopathie cérébrale post-partale

Postpartum angiopathy

Migraineuse

'Thunderclap' headache

Hypertension systémique

Dualité diagnostique

- Angiographie: diagnostic (+)
- Imagerie parenchymateuse: complications

	<i>invasivité</i>	<i>vaisseaux</i>	<i>parenchyme</i>
IRM (DWI + MRA)	0	+	+++
CT (NCCT + CTA)	+	++	++
DSA	+++	+++	0

Homme de 21 ans : hémiparésie gauche en aggravation sur 24 heures NIHSS 6 → 10

Place à la sémiologie !

ACI G

ACI D

Après dilatation

SVEICA (Spontaneous vasoconstriction of extracranial internal carotid artery)
attaques récidivantes de phénomènes de vasoconstriction - mécanisme méconnu

Vasculopathies/vasculites génétiques/inflammatoires

Vasculopathies/ites **génétiques 'pures'**

Anémie falciforme

CADASIL (CARASIL)

Angiopathie amyloïde

Vasculopathies/ites à **participation génétique**
Moya-Moya

Vasculites inflammatoires systémiques auto-immunes

Behçet

LED

SAP

Anémie falciforme

SCD – *Sickle Cell Disease*

Affection génétique **autosomale récessive** touchant le gène de l'hémoglobine

- GR déformés et rigides -> **crises vaso-occlusives systémiques**
 - **état inflammatoire procoagulant de la vascularisation cérébrale** -> fibrose et sténoses
- ➔ stroke pédiatrique entre l'âge de 2 et 5 ans

© Anne G. OSBORN

Diploé épaisse
Moelle osseuse hyperplasique

Pattern ischémique
PROXIMAL

Pattern ischémique
DISTAL

CADASIL

Cerebral **A**utosomal **D**ominant **A**rteriopathy with **S**ub-cortical **I**nfacts and **L**eucoencephalopathy

Maladie **g**énétique '**p**ure' **a**utosome **d**ominante NOTCH 3

(30% des primodiagnosics ont une anamnèse familiale +)

Infarctus 'éloquents' -----> diagnostic plus précoce

Infarctus 'silencieux' -> dégradation cognitive -> diagnostic plus tardif

10% épilepsie -----> diagnostic encore plus tardif

Expression symptomatique débute en 3^{ième} décade (moyenne) -> scolarité 'normale'

Signes IRM précèdent de ± 10 ans les signes cliniques

~~'screening familial' en IRM~~

Aspécifiques:

- WMH péri-ventriculaires: '*leucoaraiose*' sévère inattendue pour l'âge
- lacunes des NGC

Spécifiques: *localisations* de la leucoaraiose

- pôle temporal antérieur
- capsule externe de manière bilatérale – pas forcément symétrique

Diagnostic:

- biopsie musculaire : dépôts granulaires osmiophiles
- génétique : allèle ECS du NOTCH3

Forme récessive japonaise: CARASIL

Homme
40 ans

Femme
47 ans

Maladie génétique : gène APP sur le chromosome 21

* Héritaire: rare

* Sporadique: allèle APOE*E4 [rare avant 55 ans*]

Amyloïdopathie secondaire:

* hémodialyse

* carcinome médullaire de la thyroïde

* diabète type 2

*Forme sporadique rare avant 55 ans

Forme héréditaire se présente 1 à 2 décade plus tôt.

Déposition progressive de Bêta amyloïde dans les parois des vaisseaux de petit et moyens calibres, surtout les artérioles perforantes:

- **corticalité supra-tentorielle**
- **leptoméninges**

Épargne relative des NGC / tronc cérébral / cervelet

Leucoaraiose
Petits infarctus

Hématomes lobaires frontaux/pariétaux/fronto-pariétaux
Pétéchies corticales sus-tentorielles
Hémorragie méningée

5-20% de hémorragies cérébrales
cause majeure de démence en population âgée

Formes rehaussantes d'angiopathie amyloïde (II)

ABRA: Amyloid Bêta-related angeitis

ACAA: Acute Cerebral Amyloid Angiopathy

Diagnostic génétique

Médecine nucléaire: traceurs analogues de la protéine amyloïde 11CPIB

Clusters van verhoogde amyloid deposities thv. de frontale cortex bilateraal, temporaal voornamelijk rechts, thv. de precuneus bilateraal, hoog parietaal en thv. de basale kernen: amyloid positief onderzoek.

Diagnostic différentiel des (micro)-bleeds

- HTA systémique (sévère – longue durée)
- Micro-infarctus hémorragiques
- Micro-cavernomatose multiple
- Micro-métastases hémorragiques
- **Angiopathie cérébrale amyloïde**

Vasculites (angéites) inflammatoires systémiques auto-immunitaires

Artérite à cellules géantes
Takayasu
Wegener
Churg-Strauss
PAN
Purpura de Henoch-Schönlein
Vasculite d'hypersensibilité

ACR 1990

Vasculite à immuns complexes
Vasculite à cryoglobulines
Vasculite à ANCA
Polyangéite nécrosante (VS PAN)

CHCC 2007

Behçet

LED

SAP

MALADIE de BEHCET

Vasculite **inflammatoire chronique** 'idiopathique' (**auto-immune**) à décours **rémissions/rechutes**

Lésions muqueuses ulcératives: aphtose buccale et génitale essentiellement
+/- 25% d'atteinte du SNC

- **forme parenchymateuse: TC > NGC > SB hémisphérique**
- atteintes non parenchymateuses
 - occlusion artérielles
 - occlusions veineuses
 - anévrysmes

DD 'rapide':

- Sclérose en plaques: PAS de bandes oligoclonales
- Sarcoïdose : PAS de majoration de l'ACE

Homme 42 ans

09.2012

06.2017

09.2012

06.2017

LUPUS ERYTHEMATEUX DISSEMINÉ (LED)

SLE = *Systemic Erythematosus Lupus*

Pathogénie complexe

- auto-Ac circulants
- complexes immuns circulants
- anomalies du complément
- dysfonction des lymphocytes T suppresseurs
- cytokines

Maladie auto-immune systémique avec participation neurologique dans 30-40% des cas

- **NSLE** : neurolupus (somatique)
- **NPSLE**: lupus psychiatrique (fonctionnel)

Neuro-lupus = angéite inflammatoire auto-immune

'Basique': angéite auto-immune

'Associé':

- coagulopathie (syndrome anti-phospholipides)
- athérogénèse accélérée par la corticothérapie

Sténoses artérielles (petites et moyennes artères)

Thrombi fibrineux sans vasculite histologique

angéite

coagulopathie

IRM du patient lupique:

- Normale
- Pathologique aspécifique
 - atrophique aspécifique
 - leucoaraiose: Fazekas 1→3

Pathologique avec pistes de 'spécificité'

- * prises de contraste en phase aiguë ('poussée'): *maladie 'active'*
- * thrombophlébites (overlay avec le syndrome anti-phospholipides)
- * PRES

SYNDROME ANTI-PHOSPHOLIPIDES

APS = Anti-Phospholipid Syndrome

Angéite inflammatoire auto-immune en **overlapping** avec le SLE 25-40%

IRM

- ~~Normale~~ **MOINS souvent** normale
- Pathologique aspécifique
 - atrophique ~~aspécifique~~ **pariétale bilatérale**
 - leucoaraiose: charge lésionnelle **plus lourde**

Pathologique avec pistes de 'spécificité'

- * prises de contraste en phase aiguë ('poussée'): *maladie 'active'*
- * **thrombophlébites** (overlay avec le syndrome anti-phospholipides)
- * PRES

Pistes de spécificité APS vs LED

- * combinaison d'infarctus d'âge différents
- * combinaison d'infarctus artériels **et** veineux

Présentations cliniques de l'APS:

- *Livedo reticularis* : syndrome de Sneddon
- Contexte de grossesse : perte du fœtus
- MID (Multi Infarct Dementia)
- Syndrome HELLP: **H**emolysis **E**levated **L**iver enzymes **L**ow **P**latelets
- Forme hyperaiguë 50% de mortalité

Diagnostic de syndrome anti-phospholipide

1 critère **clinique**

+

1 critère **biologique**

- Anticoagulant lupique persistant
- Auto-Ac anti phospholipides (anti-cardiolipine)
- Auto-Ac anti Bêta2-glycoprotéine

+

0 critère radiologique

Vasculite?

Nécrose hémorragique
Cortex + NGC

'Œdème migratoire'
Prises de contraste

Hypertension artérielle
+
Dysfonction de la vasoconstriction autonome

Hyperperfusion rCBF majoré

Fuite de liquide et macromolécules **sériques** dans l'interstitium

Oedème **VASOGENIQUE** et NON CYTOTOXIQUE

PRES *'pur'*

- Poussée hypertensive
- Drogues neurotoxiques pour le SNA

PRES *'associé'*

- (pré)éclampsie
- Sepsis surtout avec choc
- Néphropathies urémiques: nephrite lupique – glomérulonéphrite
- Micro-angiopathies thrombotiques: DIC – purpura TTCp – SHU

Tous âges: enfant -> veillard

Légèrement plus de femmes probablement en raison de l'association avec l'éclampsie

10 >

178 >

11 >

179 >

CT versus IRM ?

Couper le cou au canard : *'on ne voit rien en CT scanner'*

Symptomes de PRES

- Céphalées
- Troubles visuels
- Altération de vigilance
- E. GM monophasique (24h)

10% de normo-tendus !

• FLAIR vs DWI

- Séquence de susceptibilité

5-15 des PRES sont hémorragiques

Vrai DD

- Thrombose du SSS
- Métastases
- (Encéphalopathie hypertensive)

Faux DD

- AVC bi-occipital
- Hypoglycémie
- RCVS

PRES aigu → PRES tardif