

Colonne lombaire

Surview 350 depuis l'apophyse Xiphoidé

Acquisition :

- si patient < 60 ans → spire du pédicule de L3 à S1
- si patient > 60 ans → spire du pédicule de L1 à S1

Reconstruction

- filtre mou 1/0.5 fenêtré 50/350
- filtre os 1/0.5 fenêtré 300/1600

MPR sagittales 2/2 en filtre mou et filtre os

- sur axiales (pas de double obliquité sur coronales)
- de la gauche vers la droite

MPR axiales 2/2 en filtre mou 3 derniers niveaux

- de pédicule à pédicule (environ 8 à 12 coupes)
- dans l'axe des disques à planifier sur sagittales (pas de double obliquité sur coronales)
- en craniao-caudal.
- Intitulé des séries : L3-L4, L4-L5, L5-S1 (pas de chiffre ou lettre additionnels)

Colonne cervicale

Surview 250

Acquisition :

- du milieu du disque C2-C3 à D1
- post trauma : C0 à D1

Reconstruction

- mou et dur 0.8/0.4

MPR sagittales 2/2 en filtre mou et filtre os

- sur axiales (pas de double obliquité sur coronales)
- de la gauche vers la droite

MPR axiales 2/2 en filtre mou de C3-C4 à C7-D1 (5disques)

- de pédicule à pédicule (environ 8 à 12 coupes)
- dans l'axe des disques à planifier sur sagittales (pas de double obliquité sur coronales)
- en craniao-caudal.
- Intitulé des séries : C3-C4, C4-C5,...pas de chiffre ou lettre additionnels)